



ŠTETNIK	ODRASLI	LIČINKE	OŠTEĆENJA	OPIS LIČINKE	PREDATORI	VRIJEME PRIMJENE
Ličinke pipa <i>Otiorhynchus sulcatus</i> 12 mjeseci				8-10 mm dugačka, bijele boje, smeđe glave, uvinuta u obliku slova „C“		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U zatvorenome prostoru tijekom cijele godine
Pipe <i>Curculionidae</i> 12 mjeseci				8-10 mm dugačka, bijele boje, smeđe glave, uvinuta u obliku slova „C“		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vrtni ružičar <i>Phyllopertha horticola L.</i> 12 mjeseci				Ličinka <20 mm, žive u tlu u zoni korijena, travnjaka, analni otvor liči na smješka		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Šest tjedana nakon leta postaviti mamce
Lipanski hrušt <i>Amphimallon solstitialis</i> 24 mjeseca				Ličinke >20 mm, analni otvor u obliku okrenutog slova „Y“ - vidi sliku		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Isključivo ličinke prvog stadija
Rovac <i>Gryllotalpa Gryllotalpa</i> 14 mjeseca		Štetu rade odrasli	Razrovane gredice, rupe, nagrižen korijen povrća i gomolja, „prevrnuti“ presadnice	Bijele, mravima slične ličinke; <u>EPN suzbija odrasle rovce</u>		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Iduće godine ponoviti
Svibanjski hrušt <i>Melolontha melolontha L.</i> 3-5 godina				Ličinke >20 mm, na trbuhu duge paralelne dlake, analni otvor kao „crtica“		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maikäfer
Kornjaši <i>Hoplia philanthus</i> 24 mjeseca				Ličinke <20 mm, imaju dlake „krzno“ na leđima		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mala crna mušica <i>Bradysia spp.</i> 12 mjeseci			Izbljedjele površine u travnjaku, u ožujku / travnju do 300 ličinku m ²	Ličinke <15 mm bez nogu, slične glisti, sivo smeđe boje		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kornjaši <i>Coleoptera</i> 12 mjeseci			Štete na travnjaku u rano proljeće, aktivne su kroz cijelu zimu	Ličinke <15 mm, nespecifičan analni otvor		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sovice <i>Agrotis spp. Agrotis ipsilon, Euxoa Temera, Tipula palidosa</i> 6 mjeseci				Sivo zelene boje, 3-5 cm duljine, glatka koža bez dlaka, 3 para nogu		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šampinjonska mušica <i>Sciariidae, Lycoriella spp.</i> 21 dana				Staklasto bijele ličinke, max. 5 mm dužine, crne glave, žive prvenstveno u humusnom tlu / supstratu		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jednakošci <i>Isopoda</i> 1-2 godine		Štetu rade odrasli				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Komari <i>Noctuidi, Agrotis segetum</i> 12 mjeseci			U ožujku / travnju ogoljele površine u travnjaku prouzrokovane pticama koje „pikaju“ ličinke	Ličinke sive boje, bez nogu, skupčane 1 cm, rastegnute do 4 cm, analni otvor u obliku „vražjeg lica“		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jabučni savijač <i>Cydia pomonella</i> 6 mjeseci				20-30 mm dugačke, bijela kasnije crvenkasta, s crnom glavom		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Legenda: vrijeme razvoja

Učinkovitost: Dobra Srednja